

Produktinformation

Aktivin® DHH

Alkoholisches Haut- und Händedesinfektionsmittel
2-Propanol 70% (V/V)

RKI
VAH
IHO

Beschreibung/ Eigenschaften:	Aktivin® DHH ist ein alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben in die Hände und Haut. Ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe oder sonstige Zusatzstoffe, daher sehr hautverträglich.																																																						
Stoff- oder Indikationsgruppe:	Desinfektionsmittel																																																						
Art der Anwendung:	Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen																																																						
Anwendungsgebiete:	Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühllumschläge.																																																						
Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:	<p>Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.</p> <p>Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten* lang feucht gehalten.</p> <p>Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten.</p> <p>Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten.</p> <p>Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten** lang feucht gehalten. Für Kühllumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.</p> <p>* Gemäß VAH-Zertifikat wurde eine Einwirkzeit von 1,5 Minuten bestätigt. ** Gemäß VAH-Zertifikat wurde eine Einwirkzeit von 3 Minuten bestätigt.</p>																																																						
Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten</th> <th>15s</th> <th>30s</th> <th>1min</th> <th>1,5min</th> <th>3min</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Händedesinfektion</td> </tr> <tr> <td>Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion *</td> <td>EN 1500/ VAH</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion *</td> <td>EN 12791/ VAH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hygienische Händedesinfektion im Seuchenfall gemäß IfSG</td> <td>RKI/DVV</td> <td>Wirkungsbereich A</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mykobakterizid (M. avium und M. terrae)</td> <td>EN 14348</td> <td>niedrige und hohe Belastung</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>begrenzt viruzid</td> <td>RKI/DVV/ EN 14348</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten		15s	30s	1min	1,5min	3min	Händedesinfektion							Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion *	EN 1500/ VAH		x				Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion *	EN 12791/ VAH				x		Hygienische Händedesinfektion im Seuchenfall gemäß IfSG	RKI/DVV	Wirkungsbereich A	x				mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung	x				begrenzt viruzid	RKI/DVV/ EN 14348		x			
Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten		15s	30s	1min	1,5min	3min																																																	
Händedesinfektion																																																							
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion *	EN 1500/ VAH		x																																																				
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion *	EN 12791/ VAH				x																																																		
Hygienische Händedesinfektion im Seuchenfall gemäß IfSG	RKI/DVV	Wirkungsbereich A	x																																																				
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung	x																																																				
begrenzt viruzid	RKI/DVV/ EN 14348		x																																																				

Banken

Wiesbadener Volksbank
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
BIC WIBA DE 5W

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE FF 510

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
ÖKOPROFIT

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:	Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			15s	30s	1min	1,5min	3min
	Hautantiseptik							
	Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik vor Injektionen und Punktionen*	VAH		x				
	Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen sowie operativen Eingriffen*	VAH			x			
Anwendungsempfehlung zur Hautantiseptik auf talgdrüsenreicher Haut*	VAH						x	
*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)								
Ergänzende Prüfergebnisse nach EN				15s	30s	1min		
bakterizid	EN 13727	niedrige und hohe Belastung		x				
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	niedrige und hohe Belastung		x				
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung		x				
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige und hohe Belastung		x				
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige und hohe Belastung					x	
Gegenanzeigen:	Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.							
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:	Keine bekannt.							
Nebenwirkungen:	Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.							
Meldung von Nebenwirkungen:	Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht hier angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn (www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.							
Wirkstoff:	2-Propanol 70% (V/V). Alkoholische Haut-/Händedesinfektion.							
Zusammensetzung:	100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 63,1 g 2-Propanol. sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser							
Warnhinweise:	Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen.							

Banken

Wiesbadener Volksbank
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
BIC WIBA DE 5W

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE 3301

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
ÖKOPROFIT

Verpackungsgrößen:	150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5L
Produktstatus:	Zugelassen nach AMG (Arzneimittelgesetz) in Deutschland. Zul.-Nr. 1599.98.99.
Hersteller/ pharmazeutischer Unternehmer:	Dr. Schumacher GmbH Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld Tel.: +49 5664 9496-0 E-Mail: info@schumacher-online.com Homepage: www.schumacher-online.com

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht, die Ware für seinen speziellen Einsatzzweck zu prüfen. Jegliche Haftung für unsere Hinweise ist ausgeschlossen.

Stand: Januar 2023, V05, Ka

Aktivin DHH Haut/Händedesinfektion

Wirkstoff: 2-Propanol 70% (V/V). Alkoholische Haut-/Händedesinfektion. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 63,1 g 2-Propanol. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühllumschläge. Gegenanzeigen: Nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet. Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Warnhinweise: Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen. Stand: 02/2022.

**Dr. Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
34323 Malsfeld**

**Tel. 05664/9496-0
info@schumacher-online.com**

Banken

Wiesbadener Volksbank
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
BIC WIBA DE 5W

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE 33 01

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
ÖKOPROFIT